



의약품상세정보

마그밀에스정(산화마그네슘)

기본정보

제품명	마그밀에스정(산화마그네슘)
성상	흰색의 원형정제
모양	원형
업체명	삼남제약(주)
위탁제조업체	
전문/일반	일반의약품
허가일	2014-07-18
품목기준코드	201403242
표준코드	8806537020601, 8806537020618
기타식별표시	장축크기 : 8.9mm 단축크기 : 8.9mm 두께 : 4.62mm



원료약품 및 분량

1정(410.0mg) 중

순번	성분명	분량	단위	규격	성분정보	비교
1	산화마그네슘	250.0	밀리그램	KP		

첨가제 : 젤라틴, 카르복시메틸셀룰로오스칼슘, 정제수, 스테아르산마그네슘, 미결정셀룰로오스

e약은요 정보

[PDF다운로드](#)
[XML다운로드](#)
[HTML다운로드](#)

효능효과

[PDF다운로드](#)
[XML다운로드](#)
[HTML다운로드](#)
[변경이력](#)

1. 주요능 효과

- 1) 다음 질환의 제산작용 및 증상의 개선 : 위·십이지장궤양, 위염, 위산과다
- 2) 변비증

용법용량

PDF다운로드

XML다운로드

HTML다운로드

변경이력

o 성인

- 1) 위·십이지장궤양, 위염, 위산과다 : 산화마그네슘으로서 1일 0.5-1g을 수회(여러 차례) 분할 경구투여한다.(먹는다,복용한다)
 - 2) 변비증 : 1일 2g을 1-2회 분할 경구투여한다.(먹는다,복용한다)
- 다만, 초회는 최소량을 복용하고 변의 모양과 상태를 보면서 조금씩 증량 또는 감량한다.

사용상의주의사항

PDF다운로드

XML다운로드

HTML다운로드

변경이력

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것 ○

- 1) 신장애 환자(심한 신기능장애 환자에서 고마그네슘혈증이 나타날 수 있다.)
- 2) 설사 환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것 ○

- 1) 심기능 장애 환자
- 2) 고마그네슘혈증 환자
- 3) 고령자(만 65세 이상)

3. 부작용 ○

- 1) 소화기계 : 때때로 설사 등이 나타날 수 있다.
- 2) 대사이상 : 장기 대량투여에 의하여 고마그네슘혈증이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하고 이상이 인정되는 경우에는 감량 또는 휴약 등 적절한 처치를 한다.

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용(사용)을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것 ○

- 복용 후 다음 증상이 나타난 경우
- 1) 순환기 : 일어섰을때 느끼는 현기증, 맥이 느려짐
- 2) 정신신경계 : 강한 졸음, 의식이 희미해짐

3) 기타 : 숨막힘, 근력저하, 구강건조, 구토

5. 일반적 주의

마그네슘 중독증상이 나타나면 칼륨염을 주사한다.

6. 상호작용

- 1) 테트라사이클린계 항생물질의 흡수를 저해할 수 있으므로 병용투여하지 않는다.
- 2) 이 약의 흡착작용 또는 소화관내 체액의 pH 상승에 의해 병용 약물의 흡수, 배설에 영향을 줄 수 있으므로 신중히 투여한다.
- 3) 다량의 우유, 칼슘제제와 병용시 우유 알칼리 증후군(고칼슘혈증, 고질소혈증, 알카리증 등)이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하고 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지한다.

7. 저장상의 주의사항(캡셀제)

공기 중에서 습기 또는 CO₂를 흡수하므로 보관에 주의한다.

재심사, RMP, 보험, 기타정보

저장방법	밀폐용기, 실온(1~30°C)보관
사용기간	제조일로부터 36 개월
재심사대상	
RMP대상	
포장정보	1000정/병
보험약가	653702060 (36원-2017.02.01~)
ATC코드	A02AA02 (magnesium oxide)

생산실적 (단위 : 천원)

[생산실적 엑셀다운로드](#)

년도	생산실적
2022	1,535,030
2021	579,332
2020	344,272

년도	생산실적
2019	486,105
2018	565,723

변경이력

변경이력 엑셀다운로드

닫기