



의약품상세정보

마그밀정(수산화마그네슘)

기본정보

제품명 마그밀정(수산화마그네슘)

성상 흰색의 원형정제

모양 원형

업체명 삼남제약(주)

위탁제조업체

전문/일반 일반의약품

허가일 1974-09-02

품목기준코드 197400246

표준코드 8806537002409, 8806537002416, 8806537002423, 8806537002430, 8806537002447, 8806537002454, 8806537002461

기타식별표시 식별표시 : SN010003 장축크기 : 11.1mm 단축크기 : 11.1mm 두께 : 5.0mm



원료약품 및 분량

1정(650.0mg) 중

순번	성분명	분량	단위	규격	성분정보	비교
1	수산화마그네슘	500.0	밀리그램	KP		

첨가제 : 미결정셀룰로오스, 저치환도히드록시프로필셀룰로오스, 톨크, 카르복시메틸셀룰로오스칼륨

e약은요 정보

PDF다운로드

XML다운로드

HTML다운로드

동영상보기

효능효과

PDF다운로드

XML다운로드

HTML다운로드

변경이력

1. 주요능 효과

- 1) 다음 질환의 제산작용 및 증상의 개선 : 위·십이지장궤양, 위염, 위산과다
- 2) 변비증

용법용량

PDF다운로드

XML다운로드

HTML다운로드

변경이력

1. 성인

- 1) 위·십이지장궤양, 위염, 위산과다 : 수산화마그네슘으로서 1일 1-2.5g을 수회 분할 경구투여한다.
- 2) 변비증 : 1일 1-2g을 1-2회 분할 경구투여한다.
 - 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

사용상의주의사항

PDF다운로드

XML다운로드

HTML다운로드

변경이력

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것. ○

- 1) 신장애 환자(심한 신기능장애 환자에서 고마그네슘혈증이 나타날 수 있다.)
- 2) 설사 환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것. ○

- 1) 심기능장애 환자
- 2) 고마그네슘혈증 환자

3. 부작용 ○

- 1) 소화기계 : 때때로 설사 등이 나타날 수 있다.
- 2) 대사이상 : 장기 대량투여에 의하여 고마그네슘혈증이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하고 이상이 인정되는 경우에는 감량 또는 휴약 등 적절한 처치를 한다.

4. 일반적 주의 ○

마그네슘 중독증상이 나타나면 칼륨염을 주사한다.

5. 상호작용 ○

- 1) 테트라사이클린계 항생물질의 흡수를 저해할 수 있으므로 병용투여하지 않는다.

- 2) 이 약의 흡착작용 또는 소화관내 · 체액의 pH 상승에 의해 병용 약물의 흡수 · 배설에 영향을 줄 수 있으므로 신중히 투여한다.
- 3) 다량의 우유, 칼슘제제와 병용시 우유 알칼리 증후군(고칼슘혈증, 고질소혈증, 알칼리증 등)이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하고 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지한다.

6. 저장상의 주의사항 ○

- 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 직사일광을 피하고 되도록이면 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관한다.
- 3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.

재심사, RMP, 보험, 기타정보

저장방법	밀폐용기, 실온(1~30°C)보관
사용기간	제조일로부터 36 개월
재심사대상	
RMP대상	
포장정보	200정(10정/PTP포장X20), 210정(10정/PTP포장X21), 500정/병, 1000정/병
보험약가	653700240 (23원-2023.06.01~)
ATC코드	A02AA04 (magnesium hydroxide)

생산실적 (단위 : 천원)

생산실적 엑셀다운로드

년도	생산실적
2022	9,157,418
2021	11,233,321
2020	9,525,838
2019	9,916,356
2018	8,753,666

변경이력

변경이력 엑셀다운로드

닫기